

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

1027

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C. C. P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D. D. A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

DLP 19-7-68 816214

Supplément n°1 au bulletin du mois de juillet 1968.

15 juillet 1968.

Information

MAÏS

PYRALE DU MAÏS

Si cet insecte est observé dans la plupart des zones de cultures de Maïs de notre Circonscription, c'est dans la région de la Hardt (Haut-Rhin) que les populations se sont montrées les plus dangereuses les années dernières.

D'après les observations en cours cette année (contrôle de l'activité des papillons et des dépôts de pontes), il apparaît bien que cette même région sera encore l'une des plus exposée. Des dégâts sont également à craindre, mais d'une façon plus inégale dans les cultures de la région du Kochersberg et de la plaine d'Alsace.

Opérer un traitement insecticide dès réception du présent avis, en commençant par les parcelles les plus avancées. Cette intervention devra de toute façon être terminée avant que les panicules mâles ne soient complètement dégagées. On emploiera une spécialité insecticide en épandage de granulés à base de :

- D.D.T.: 40 kg/ha d'une spécialité commerciale à 5% de matière active.
- Heptachlore: 40 kg/ha d'une spécialité commerciale à 5% de matière active.

Dans le secteur de Wissembourg où les vols sont encore faibles attendre un nouvel avis pour intervenir.

Dans le Sundgau et plus spécialement dans le secteur d'Altkirch, ce traitement insecticide ne paraît pas nécessaire.

.../...

438

CULTURES LEGUMIERES

MILDIOU DE LA TOMATE

Nous sommes au début de la période critique, au cours de laquelle la maladie risque de progresser rapidement. Un traitement fongicide doit être exécuté au plus tôt. Cette protection devra d'ailleurs être maintenue d'une façon régulière jusqu'à la récolte. Utiliser le Manèbe ou le Mancozèbe à 160 gr de matière active à l'hectolitre.

PUCERON CENDRE DU CHOU

On observe actuellement une très forte attaque de Pucerons cendrés sur choux, et dans bien des cas un traitement aphicide s'impose d'urgence.

THRIPS DU POIREAU

Des dégâts de Thrips sont visibles dans bien des cultures de poireaux notamment en Alsace. On peut lutter contre ce ravageur en opérant un traitement avec l'un des produits suivants : (par trempage des plants avant repiquage ou en pulvérisation).

- Parathion ethyl:25 gr/hl - Parathion methyl:40gr/hl - Diazinon:25 gr/hl -
Malathion:75 gr/hl - Lindane:30 gr/hl - D.D.T.: 100 gr/hl.

Ce traitement est également efficace contre la Teigne du poireau dont les attaques vont débiter incessamment.

Les Contrôleurs chargés des
Avertissements Agricoles :

J. BERNARD et C. GACHON

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux

J. HARRANGER